

VACINAÇÃO

- Vacinação contra a Brucelose é **OBRIGATÓRIA**
- A vacinação é a **melhor forma de evitar** a brucelose.
- A vacinação é realizada uma única vez e é **válida para a vida toda** do animal;
- Vacinar bezerras entre **3 e 8 meses de idade**;
- As bezerras vacinadas com a vacina **B19** deverão ser marcadas com o algarismo final do ano de vacinação, por exemplo, em 2021, será o número **1**;

- Fêmeas vacinadas com **RB51** serão marcadas com um **V**;



- Fêmeas acima de 8 meses, que não foram vacinadas de 3 a 8 meses, devem ser, obrigatoriamente, vacinadas com Rb51.

PRAZOS

- **1ª Etapa** • 1º de janeiro até 30 de junho.
- **2ª Etapa** • 1º de julho até 31 de dezembro

O produtor deve comunicar a vacinação ao escritório da ADAPI, onde possui cadastro, com o atestado de vacinação e a nota fiscal da vacina.

ATENÇÃO

A vacina deverá ser aplicada somente por médico veterinário ou auxiliar cadastrado na ADAPI, pois é feita com a bactéria viva atenuada e, por isso, pode causar infecção nas pessoas se for mal manipulada.



SECRETARIA
DA ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E DEFESA
AGROPECUÁRIA - SADA



Agência de Defesa Agropecuária do estado do Piauí • ADAPI
Rua 19 de Novembro, 1980.
Bairro Morro da Esperança, Teresina - Piauí.
Telefone: 86 2222-1710
pecebt@adapi.pi.gov.br

Tudo que você
precisa saber sobre

Brucelose



O QUE É BRUCELOSE?

É uma doença muito contagiosa, que ataca bovinos, bubalinos, cabras, ovelhas, suínos e pode ser transmitida ao homem.

A brucelose não tem cura ou tratamento, e os animais doentes devem ser sacrificados.

Sinais da brucelose nos animais e prejuízos causados



• Aborto;



• Inflamação dos testículos - **Orquite**;



• Retenção de placenta;

• Repetição de cio;

• Diminuição da **produção de leite**;

• Diminuição da **produção de bezerros**;

• Nascimento de **bezerros fracos**.

COMO OS ANIMAIS PEGAM BRUCELOSE?

• Pelo **contato** com restos de abortos, placenta e feto de animais contaminados;

• Ao **lamber a cria** de uma vaca doente;

• Em pastagens, água, cochos, alimentos e instalações **contaminadas**;

• Ao dar **leite de vacas doentes** para os bezerros;

• Pela **inseminação artificial** - sêmen contaminado ou pela monta natural - macho contaminado.

COMO OS PESSOAS PEGAM BRUCELOSE?

• Contato com **animais doentes**;

• Contato com **fetos abortados** e com **carcaças contaminadas** no abate;

• Ajudando na hora do **parto**;

• No momento da **inseminação**;

• Ao **tomar leite cru** e sem inspeção sanitária;

• Ao **comer** queijos, iogurtes, coalhadas e outros derivados de leite sem inspeção sanitária.

QUAIS OS SINAIS DE BRUCELOSE NAS PESSOAS?

• Febre que vai e volta;

• Dores de cabeça;

• Dores nas juntas;

• Suores noturnos;

• Inflamação dos testículos e infertilidade.



**A vacinação
contra brucelose
protege
seu rebanho.**