

VACINAÇÃO

- Vacinar bezerras entre 3 e 8 meses de idade; Uma única dose da vacina é válida para toda a vida do animal;



As bezerras vacinadas com a Vacina B19 deverão ser marcadas do lado esquerdo da cara com o algarismo final do ano de vacinação. Por exemplo, em 2023 o número será 3;



Fêmeas vacinadas com a RB51 serão marcadas com um V do lado esquerdo da cara;

- Fêmeas acima de 8 meses de idade e que não foram vacinadas entre 3 e 8 meses de vida, devem ser vacinadas com a RB51, obrigatoriamente;
- A vacina contra a brucelose deve ser aplicada somente por médico veterinário ou auxiliar cadastrado na ADAPI, pois é feita com a bactéria viva, por isso, pode causar infecção nas pessoas se manipulada inadequadamente.

O QUE O PRODUTOR DEVE FAZER?

1º Passo: O produtor deve procurar um médico veterinário ou vacinador cadastrado na sua região para fazer a vacinação, fazer a marcação de suas bezerras e emitir o atestado de vacinação;

2º Passo: Em posse do atestado, o produtor deve comunicar a vacinação ao escritório da ADAPI onde possui cadastro.

FIQUE LIGADO!

A propriedade que não comprovar a vacinação das bezerras será proibida de comercializar leite a laticínios, e também de movimentar seu rebanho.



COORDENADORIA
DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL - CCOM

SECRETARIA
DA ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E DEFESA
AGROPECUÁRIA - SADA



GOVERNO DO
PIAUI
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA
E PECUÁRIA



GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

VACINE CONTRA A BRUCELOSE



BEZERRAS
ENTRE
3 E 8
MESES DE
IDADE

O QUE É A BRUCELOSE?

É uma doença muito contagiosa, que ataca bovinos, bubalinos, cabras, ovelhas, suínos e pode ser transmitida ao homem.

A brucelose não tem cura, nem tratamento, e os animais contaminados devem ser abatidos ou sacrificados. A vacinação contra a brucelose é OBRIGATORIA para bovinos e bubalinos.

SINAIS DA BRUCELOSE NOS ANIMAIS E PREJUÍZOS CAUSADOS



ABORTO

A brucelose compromete a reprodução.

RETENÇÃO DE PLACENTA

A doença também provoca dificuldades no parto.



ORQUITE

Inflamação grave nos testículos do animal.

- **Repetição de cio;**
- **Diminuição da produção de leite;**
- **Diminuição da produção de bezerros;**
- **Nascimento de bezerros fracos.**

COMO OS ANIMAIS PEGAM BRUCELOSE?

- Através do contato com restos de abortos, placenta e feto de animais contaminados;
- Ao lambar a cria de uma vaca doente;
- Em pastagens, cochos, alimentos, água e instalações contaminadas;
- Ao dar leite de vacas doentes para os bezerros;
- Pela inseminação artificial, através do sêmem contaminado ou pela monta natural, macho contaminado.

COMO AS PESSOAS PEGAM BRUCELOSE?

- Contato com animais doentes;
- Contato com fetos abortados e com carcaças contaminadas no abate;
- Ajudando na hora do parto;
- No momento da inseminação;
- Ao tomar leite cru e sem inspeção sanitária;
- Ao comer queijos, iogurtes, coalhadas e demais derivados do leite sem inspeção sanitária.

QUAIS OS SINAIS DE BRUCELOSE NAS PESSOAS?

- Febre que vai e volta;
- Dores de cabeça;
- Dores nas juntas;
- Suores noturnos;
- Inflamação dos testículos;
- Infertilidade.



**A vacinação
contra a brucelose
melhora a reprodução
e a qualidade do leite.**

